Les Mollusques de France de la Collection Locard. *Mollusques terrestres* (suite). *Familles* Zonitidæ (suite), Endodontidæ, Eulotidæ, Leucochroidæ, Helicidæ

Par Gustave Cherbonnier.

Genre Retinella (Shuttleworth) Fischer, 1877.

[*Hyalinia* Agassiz, 1837 (pars) ; *Aplostoma* Moquin-Tandon, 1855 (pars) ; *Aepogina* Kobelt, 1878 ; *Helicella* Hennard et Woodward, 1921 (non de Férussac, 1821) ; *Parpolita* Pilsbry, 1928].

Retinella olivetorum (Gmelin, 1789).

Zonites olivetorum Locard. Italie : Province de Lucques [V-2].

Retinella incerta (Draparnaud, 1805).

1. — *Hyalinia incerta* (Draparnaud, 1805). Ariège : Axiat, Bastide de Sérou. Basses-Pyrénées : Urrugne, Hendaye, Montagne de Larhune. Gers : Auch, Lectoure. Haute-Garonne : Cierp, Saint-Simon. Lot-et-Garonne : Agen [V-2].
2. *Hyalinia vasconica* (Bourguignat, 1880). Basses-Pyrénées : Hendaye Salies-de-Béarn. Haute-Garonne : Marignac, Toulouse [V-2].

Retinella nitens (Gmelin, 1789).

1. *Hyalinia nitens* (Gmelin, 1789). Ain : Gex, Le Colombier. Allier : Moulins. Haute-Garonne : Saint-Michel près Toulouse. Isère : Voreppe. Rhône : Le Mont d'Or Lyonnais [V-2].
2. — *Hyalinia atonolena* Bourguignat, 1894. Ain : Hauteriv[illegible]. Finistère Brest. Hautes-Pyrénées : Cauterets. Rhône : Mon[illegible]at [V-2].
3. — *Hyalinia cuzyensis* Bourguignat, 1894. Ariège : Alzen [V-2].
4. — *Hyalinia demiranda* Bourguignat, 1894. Allier : Moulins. Isère : Saint-Pierre de Chartreuse [V-2].
5. — *Hyalinia Dutaillyana* (Mabille, 1878). Ain : Chevry. Doubs : Source du Doubs. Meurthe-et-Moselle : Boucq. Rhône : Lyon-Saint-Clair, Oullins. Suisse : Genève [V-2].
6. — *Hyalinia epipedostoma* (Bourguignat, 1879). Lot-et-Garonne : Port-Sainte-Marie. Var : Hyères [V-2].
7. — *Hyalinia Jourdheuili* Ray, 1880. Seine : Environs de Paris [V-2].
8. — *Hyalinia lenaploa* Bourguignat, 1894. Rhône : Alluv. du Rhône à Lyon [V-2].
9. — *Hyalinia Stilpna* Bourguignat, 1894. Seine-Inférieure : Elbeuf [V-2].

1. Cf. *Bull. Mus.*, 2e s., t. XIV, 1942, p. 338.

Retinella nitidula (Draparnaud, 1805).

1. — *Hyalinia nitidula* (Draparnaud, 1805). Ain : Dampierre. Rhône : Mont-Pilat. Vaucluse : Avignon [V-2].
2. — *Hyalinia oltisiana*, Fagot, 1883. Aude : Carcassonne [V-2].
3. — *Hyalinia subnitens* (Bourguignat, 1871). Allier : Moulins. Charente : Angoulême. Hautes-Pyrénées : Lourdes, Saint-Sauveur. Moselle : Bionville, Metz. Nièvre : Saint-Saulge. Rhône : Bois de l'Etoile à Lyon. Seine : La Bièvre, environs de Paris. Seine-Inférieure : Rouen. Seine-et-Oise : Versailles [V-2].

Retinella hammonis (Ström, 1765).

1. — *Hyalinia radiatula* (Alder, 1830). Ain : Chavornay, Oyonnax. Allier : Moulins. Haute-Garonne : Cierp. Hautes-Pyrénées : Lourdes. Nièvre : Nevers. Puy-de-Dôme : Arlanc. Rhône : Lyon-Saint-Clair, Alluvions du Rhône à Lyon [V-2].
2. — *Hyalinia subradiata* (Fagot, 1879). Les Pyrénées [V-2].
3. — *Hyalinia viridula* (Menke, 1830). Charente : Angoulême. Charente-Maritime : La Rochelle. Hautes-Pyrénées : Cauterets. Moselle : Metz. Nièvre : Saint-Saulge. Rhône : Le Mont d'Or Lyonnais. Allemagne : Bavière [V-2].

Retinella Dumonti (Bourguignat, 1864).

Hyalinia Dumontiana (Bourguignat, 1864). Isère : Grande-Chartreuse. Moselle : Courcelles. Allemagne : Vegesach [V-2].

Retinella petronella (de Charpentier, 1853).

Hyalinia petronella (de Charpentier, 1853). Isère : Grande-Chartreuse. Lot. Italie [V-2].

Retinella pura (Alder, 1830).

1. — *Hyalinia macralsobia* Bourguignat, 1894. Moselle : Bionville. Rhône : Lyon Saint-Clair [V-2].
2. — *Hyalinia nitidosa* (de Férussac, 1821). Ain : Alluvions du Besançon Finistère : Morlaix. Gers. Maine-et-Loire : Sorges. Rhône : La Saône à Collonges, Le Mont d'Or Lyonnais, Alluvions du Rhône à Lyon [V-2].

Retinella udvarica (Servain, 1880).

Hyalinia udvarica (Servain, 1880). Moselle : Bionville [V-2].

Genre Vitrea Fitzinger, 1833.

[*Hyalinia* Agassiz in de Charpentier, 1837 (pars) ; *Polita* Heldt, 1837 (pars) : *Hyalina* Albers, 1850, non *Hyalina* Schumacher, 1817 *(Marginellidae)*, non *Hyalina* Studer, 1820 *(Vitrinidae)* ; *Crystallus* Lowe, 1854 : *Aplostoma* Moquin-Tandon, 1855 (pars) : *Discella* Gray, 1857].

Vitrea crystallina (Müller, 1774).

Hyalinia subterranea (Bourguignat, 1856). Allemagne : Vegesach près Brême [V-2].

Vitrea narbonnensis (Clessin, 1877).

Hyalinia narbonnensis Clessin, 1877. Hérault : Saint-Martin-de-Londres [V-2].

Vitrea contracta (Westerlund, 1876)

1. — *Hyalinia contracta* (Westerlund, 1876). Allemagne. Suède : Rönneby [V-2].
2. — *Hyalinia Dubreuili* Clessin, 1877. Suisse [V-2].
3. — *Hyalinia vitreola* (Bourguignat, 1880) Haute-Garonne : Toulouse [V-2].

Vitrea pseudohydatina (Bourguignat, 1856).

1. — *Hyalinia pseudohydatina* Locard, 1882. Ain : Environs de Bourg, Gex, Nantua. Bouches-du-Rhône : Fuveau. Gard : Alais. Rhône : Alluvions du Rhône à Lyon. Vaucluse : Avignon [V-2].
2. — *Hyalinia hypogaea* Bourguignat, 1884. Alpes-Maritimes : Menton. Haute-Garonne : Toulouse [V-2].
3. — *Hyalinia noctuabunda* Locard, 1882. Gard : Bagnols. Rhône : Lyon [V-2].
4. — *Hyalinia radina* Bourguignat, 1894. Drôme : Valence. Loire-Inférieure : Vertou. Finistère : Brest. Rhône : Lyon-Saint-Clair. Savoie : Aix-les-Bains [V-2].
5. — *Hyalinia sedentaria* (Bourguignat, 1880). Ain : Miribel. Hérault : Le Lez. Rhône : Lyon [V-2].

Vitrea zanclea (Bourguignat, 1880).

1. — *Hyalinia zanclea* Westerlund, 1886. Bouches-du-Rhône : Arles [V-3].
2. — *Hyalinia exaequata* Locard, 1885. Drôme : Valence. Rhône : Lyon-Saint-Clair, Alluvions du Rhône à Lyon. Var : Alluvions du Gapeau [V-3].
3. — *Hyalinia Othonia* Bourguignat, 1894. Bouches-du-Rhône : Fuveau. Hautes-Pyrénées : Luchon. Hérault : Alluvions du Lez. Var : Saint-Raphaël. Vaucluse : Mondragon [V-3].

Sous-Famille Gastrodontinæ.

Genre Zonitoïdes Lehmann.

[*Oxychilus* Fitzinger, 1833 (pars) (non *Oxycheila* Dejean, 1825, Coléopt.) ; *Hyalinia* Agassiz, 1837 (pars) ; *Polita* Held, 1837 (pars) ; *Aplostoma* Moquin-Tandon, 1855 (pars).

Zonitoides nitidus (Müller, 1774).

Hyalinia nitida (Müller, 1774). Ain : Miribel, Oyonnax. Aisne : Laon. Allier : Moulins. Ariège : Alzen. Côte-d'Or : Châtillon-sur-Seine. Finistère : Morlaix. Gard : Beaucaire. Haute-Garonne : Marignac, Toulouse. Hautes-Pyrénées : Bagnères-de-Bigorre. Hérault. Loire-Inférieure : Nantes. Lot-et-Garonne : Port-Sainte-Marie. Maine-

ET-LOIRE : Angers. MEURTHE-ET-MOSELLE : Boucq. MOSELLE : Bionville, Metz. NIÈVRE : Nevers, Saint-Saulge. RHÔNE : Collonges, Lyon-Saint-Clair, Alluvions du Rhône à Lyon, Oullins. SAVOIE : Aiguebellette. SEINE : Ile Billancourt à Paris. SEINE-ET-OISE : Argenteuil, Meudon. VAR : Hyères, Saint-Raphaël. VAUCLUSE : Avignon. DANEMARK : Sjoelland [V-3].

Zonitoides nitidus Müller var. **parisiacus** Mabille, 1869.

1. — *Hyalinia parisiaca* (Mabille, 1869). MAINE-ET-LOIRE : Angers. RHÔNE : Alluvions du Rhône à Lyon, Saint-Fons. MOSELLE : Bionville. SEINE : Bords de la Bièvre à Paris. SEINE-ET-MARNE : Lagny. SEINE-ET-OISE : Meudon [V-3].
2. — *Hyalinia Chauveliana* Bourguignat, 1894. MOSELLE : Courcelles [V-3].

FAMILLE ENDODONTIDÆ

Genre Goniodiscus Fitzinger, 1833.

[*Discus* Fitzinger, 1833 (pars) ; *Delomphalus* (Agassiz) de Charpentier, 1837 (pars) ; Moquin-Tandon, 1855 (pars) ; *Patula* Held, 1837 (pars) ; *Euromphala* Lowe, 1855 ; *Patularia* Clessin, 1876 ; *Allerya* Bougnuignat, 1878 (non Mörch, 1877) ; *Spelaeodiscus* Brusina, 1886.]

Goniodiscus rotundatus, (Müller, 1774).

Helix rotundata Müller, 1774. AIN : Chavornay, Thoy. BOUCHES-DU-RHÔNE : Arles. CALVADOS : Caen, Vire. CHARENTE : Angoulème, Puymoyen. DRÔME : Saint-Paul-Trois-Châteaux. FINISTÈRE : Brest, Morlaix. GARD : Saint-Ambroix. GIRONDE : Ile Cazeaux. HAUTES-PYRÉNÉES : Cauterets, Lourdes. ISÈRE : Allevard, Crémieu, Grenoble. LOIRE : Charlieu. MAINE-ET-LOIRE : Angers. MANCHE : Cherbourg, Saint-Lô. MEURTHE-ET-MOSELLE : Lunéville. MOSELLE : Bionville. NIÈVRE : Saint-Saulge. RHÔNE : Beaujeu, Lyon, Le Mont-d'Or Lyonnais, Saint-Fons. SAÔNE-ET-LOIRE : Solustre. SAVOIE : Aix-les-Bains. SEINE-ET-MARNE : Bellevue, Lagny. SEINE-ET-OISE : Meudon. VAR : Rians. DANEMARK [V-3].

Goniodiscus rotundatus (Müller)
variété **omalisma** Bourguignat, 1879.

Helix omalisma Bourguignat, 1879. AIN : Belley. ALPES-MARITIMES : Grasse. CHARENTE-MARITIME : La Rochelle. DRÔME : Hauterives., HAUTE-GARONNE : Luchon. HAUTES-PYRÉNÉES : Lourdes, Tarbes., RHÔNE Lyon. VAR.: Roquebrune [V-37].

Goniodiscus rotundatus (Müller)
variété **abietina** Bourguignat, 1864.

Helix abietina Bourguignat, 1864. MANCHE : Cherbourg [V-3].

Goniodiscus ruderatus (Studer, 1820).

Helix ruderata Studer, 1820. AIN : Le Colombier, Oyonnax. ARDÈCHE : Moutiers. HAUTE-SAVOIE : Le Reposoir, 1.200 mètres. ISÈRE : La Grande-Charteuse, Grenoble. RHÔNE : Lyon. ALLEMAGNE : Bavière [V-3).

Genre **Punctum** Morse, 1864.

[*Discus* Fitzinger, 1833 (pars) ; *Delomphalus* (Agassiz) de Charpentier, 1837 (pars) ; Moquin-Tandon, 1855 (pars) ; *Microphysa* Pinney, 1885 ; *Pullastra* Westerlund, 1889.]

Sous-Genre Punctum sensu stricto.

Punctum pygmæum (Draparnaud, 1801).

Helix pygmaea Draparnaud, 1801. Ain : Alluvions du Besançon. Allier. Cote-d'Or : Auxonne. Rhône : Lyon. Seine-et-Oise : Argenteuil, Meudon, Versailles [V-3].

Sous-Genre Pleuropunctum Germain, 1929.

Punctum (Pleuropunctum) micropleurum (Paget, 1854).

Helix micropleuros Paget, 1854. Hérault [V-3].

FAMILLE EULOTIDÆ

Genre **Eulota** Hartmann, 1842.

[*Fruticicola* Held, 1837 (pars) ; *Lindholm*, 1927, non auteurs ; *Bradybaena* Beek, 1837 (pars) ; *Hygromane* Moquin-Tandon, 1855 (pars).]

Eulota fruticum (Müller, 1774).

1. — *Helix fruticum* Müller, 1774. Ain : Belley. Côte-d'Or : Auxonne, Dijon, Heuilley-sur-Saône, Vonges. Doubs : Besançon. Drôme : Saint-Nazaire-en-Royans. Haute-Savoie : Amphion, Evian, Gorges du Fier, Thonon. Isère : Allevard, Decine, Feyzin, Grenoble, Moirans, Sassenage, Solaise. Jura : Salins. Meurthe-et-Moselle : Manonville. Moselle : Metz. Nièvre : Nevers. Rhône : Lyon, Oullins, Saint-Fons, Vernaison. Saône-et-Loire : La Bresse-Charolaise, Condal. Suède [V-3].
2. — *Helix aubiniana* Bourguignat, 1882. Rhône : Lyon [V-3].
3. — *Helix dumorum* Bourguignat, 1878. Isère : Allevard, Moirans, La Verpillière. Rhône : Lyon. Suisse : Fribourg [V-3].
4. — *Helix gratianensis* Bourguignat, 1894. Isère : Grenoble. Rhône : Lyon [V-3].
5. — *Helix lemonia* Bourguignat, 1882. Moselle : Bionville. Rhône : Lyon. *Var* : Saint-Raphaël [V-3].
6. — *Helix mosellica* Bourguignat, 1882. Doubs : Besançon. Gard : Beaucaire. Haute-Savoie : Thonon. Isère : Allevard, Grenoble, Moirans, Saint-Fons, La Verpillière. Rhône : Oullins. Allemagne : Bavière [V-3].
7. — *Helix subfructicum* Locard, 1892. Ain. Isère. Sassenage. Allemagne : Bavière [V-3].

FAMILLE LEUCOCHROIDÆ

Genre **Leucochroa** Beck, 1837.

[*Calcarnia* Moquin-Tandon, 1848 (non d'Orbigny, 1826) ; *Crenea* Albers, 1850 (pars) ; *Albea* Pallary, 1910.]

Leucochroa candidissima (Draparnaud, 1801).

Leucochroa candidissima (Draparnaud, 1801). Algérie : Aïn-el-Bey près Constantine, Mascara. Alpes-Maritimes : Cannes, Menton, Villefranche. Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Arles, Carry-le-Rouet, La Couronne, Etang de Berre, Saint-Chamas, Velaux. Hérault : Cette. Var : Le Luc, Rians, Sanary, La Seyne. Vaucluse : Bollène, Valréas, Venasque. [V-3].

FAMILLE HELICIDÆ

Sous-Famille Helicinæ.

Genre **Euparypha** Hartmann, 1842.

[*Theba* Risso, 1826 (pars) ; Lindholm, 1927 (non auteurs).

Euparypha pisana (Müller, 1774).

1. — *Helix pisana* Müller, 1774. Algérie : Alger. Alpes-Maritimes : Menton, Nice. Ariège : Saint-Girons. Aude : Carcassonne, Narbonne. Basses-Pyrénées : Biarritz. Bouches-du-Rhône : Marseille, Saint-Chamas. Charente : Angoulème, Puymoyen. Charente-Maritime : Ile de Ré, La Rochelle, Royat, Saint-Pardoult. Côtes-du-Nord : Saint-Quay. Finistère : Brest. Gard : Domazan, Nîmes. Haute-Garonne : Toulouse. Hérault : Lamalou, Montpellier, Palavas. Ille-et-Vilaine : Paramè. Loire-Inférieure : Le Croisic. Lot-et-Garonne : Port-Sainte-Marie. Pyrénées-Orientales : Perpignan. Rhône : Lyon. Var : Draguignan, Sanary. Vaucluse : Cucurron, Valréas. Vendée : Les Sables-d'Olonne. Portugal : Faro. [V-4].
2. — *Helix carpiensis* Letourneux et Bourguignat, 1887. Basses-Pyrénées : Saint-Jean-de-Luz. Charente-Maritime : Ile de Ré, La Rochelle. Finistère : Brest. Var : Sain-tRaphaël, Toulon. Vendée : Les Sables-d'Olonne. Portugal : Coïmbra [V-4].
3. — *Helix Cuttati* Bourguignat, 1887. Algérie : Alger. Alpes-Maritimes : Grasse. Aude : Carcassonne. Basses-Pyrénées : Biarritz, Hendaye. Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Marseille. Charente Maritime : Ile de Ré, La Rochelle. Gard : Nîmes. Haute-Garonne : Toulouse. Hérault : Montpellier, Palavas. Loire-Inférieure : Batz, Le Croisic. Lot-et-Garonne : Port-Sainte-Marie. Var : Draguignan, Sanary. Vaucluse : Avignon. Vendée : Les Sables d'Olonne. Portugal : Lisbonne [V-4].
4. — *Helix Monroi* Letourneux et Bourguignat, 1887. Aude : Carcassonne, Limoux. Var : Sanary. Vaucluse : Valréas. Espagne [V-4].
5. — *Helix pisanella* Servain, 1880. Aude : Carcassonne. Basses-Pyrénées : Hendaye, Saint-Jean-de-Luz. Bouches-du-Rhône : Arles,

Marseille, Les Martigues, Saint-Chamas. Charente : Angoulème. Charente-Maritime : La Rochelle, Royan. Gard : Aigues-Mortes. Haute-Garonne : Toulouse. Hérault : Cette. Seine : Charenton. Var : Draguignan, Sanary. Vaucluse : Cucurron. Portugal : Faro, Lisbonne [V-5].

6. — *Helix pisanopsis* Letourneux et Bourguignat, 1887. Charente-Maritime : La Rochelle. Portugal : Lisbonne [V-4].

Genre Helix Linné, 1758.

[*Cochlea* Geoffroy, 1767 ; *Pomatia* Leach, 1831 ; *Helicogena* Pilsbry, 1894.]

Sous-Genre Helix sensu stricto.

Helix pomatia Linné, 1758.

1. — *Helix pomatia* Linné, 1758. Ain : Artemmare, Bellegarde, Miribel. Ariège : Foix. Aveyron : Estaing. Doubs : Environs de Besançon. Drôme : Montélimar, Valence. Haute-Savoie : Evian, Thonon. Hautes-Alpes : Gap. Isère : Allevard, Bourgoin, Crémieu, environs de Grenoble, La Grande-Chartreuse. Jura : Arbois, Brainans, Lons-le-Saulnier, Ougney, Poligny, Saint-Amour, Saint-Claude. Loire : Salvizinnet, Pouilly-les-Nonains. Lozère : Mende. Meurthe-et-Moselle : Manonville, environs de Boucq. Nièvre : Saint-Bénin-des-Bois, Saint-Saulge. Nord : Valenciennes. Rhône : Les Ardillats, Collonges, Lyon, Le Mont-d'Or Lyonnais, Saint-Fons. Saône-et-Loire : Châlon-sur-Saône, Châteauneuf, environs de Mâcon, Russilly, Sennecey-le-Grand. Savoie : Aix-les-Bains. Seine : Environs de Paris. Seine-et-Marne : Lagny. Tarn : Albi. Suède [V-5 et V-6].

2. — *Helix Edmondi* Locard, 1882. Jura : Saint-Claude. Seine-et-Marne : Lagny. Seine-Inférieure : Rouen [V-6].

3. — *Helix promæca* Bourguignat, 1882. Jura : Brainans. Rhône : Le Mont-d'Or Lyonnais, Oullins. Saône-et-Loire : Mâcon [V-6 et V-7].[

4. — *Helix pyrgia* Bourguignat, 1882. Ain : Hauterive. Côte-d'Or : Châtillon-sur-Seine. Drôme : Die. Haute-Garonne : Villemur. Haute-Savoie : Evian, Thonon. Isère : La Motte-les-Bains. Nord : Valenciennes. Rhône : Les Ardillats, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval]V-6 et V-7].

5. — *Helix segalaunica* Sayn, 1888. Drôme : Peyras. Haute-Garonne : Villefranche-Lauraguais. Haute-Savoie : Evian. Rhône : Les Ardillats. Seine-et-Marne : Lagny [V-7].

Helix lucorum Linné, 1758.

Helix lucorum Linné, 1758. Rhône : Le Moulin à Vent près Lyon]V-7].

Sous-Genre Cryptomphalus (Agassiz, 1837) Moquin-Tandon, 1855.

[Cænatoria Held, 1837 (pars)].

Helix (Cryptomphalus) aspersa Müller, 1774.

Helix aspersa Müller, 1774. Algérie : Alger, Mascara. Alpes-Maritimes : Cannes, Menton, Ile Sainte-Marguerite. Aude : Carcassonne. Aveyron : Estaing. Bouches-du-Rhône : Marseille. Calvados : Cabourg, Caen, Villers-sur-Mer. Charente : Angoulème. Charente-Maritime : Ile de Ré, La Rochelle. Corse : Ajaccio, Bastia, Calvi. Côtes-du-Nord : Saint-Quay. Deux-Sèvres : Limalonges, Niort. Drôme : Bourdonneau, Die, Hauterive, Valence. Finistère : Douarnenez, Ouessant. Gard : Montfrin. Gironde : Ile Cazeaux. Haute-Garonne : Toulouse. Hérault : Ganges, Neffies. Isère : Crémieu, Vaugris. Loire : Rioges, Saint-Chamond. Loire-Inférieure : Le Croisic. Lot : Cahors. Lot-et-Garonne : Port-Sainte-Marie. Nièvre : Saint-Saulge. Nord : Valenciennes. Oise : Mouy. Pas-de-Calais: Boulogne-sur-Mer. Rhône : Les Ardillats, Beaujeu, Collonges, Couzon. Le Mont-d'Or Lyonnais, le Moulin à vent près Lyon, Oullins, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Rambert-l'Isle-Barbe. Saône-et-Loire : Chateauneuf. Seine : Paris, rue de l'Arsenal. Seine-Inférieure : Rouen, Le Tréport. Seine-et-Marne : Lagny. Tarn : Albi .Var : Sanary. Vaucluse : Bollène, Mondragon. Vendée : Mortagne. Italie [V-7 et V-8].

Sous-Genre Helicogena de Férussac, 1821.

[*Cænatoria* Held, 1837 (pars) ; Moquin-Tandon, 1855 (pars).

Helix (Helicogena) melanostoma Draparnaud, 1801.

Helix melanostoma Draparnaud, 1801. Alpes-Maritimes : Cannes, Ile Sainte-Marguerite. Aude : Narbonne. Bouches-du-Rhône : Arles, Etang de Berre, Environs de Marseille, Les Martigues, Saint-Chamas. Hérault : Cette. Var : Gonfaron, Sanary. Tunisie [V-8].

Sous-Genre Santereus Risso, 1826.

[*Tapada* (Gray) Turton, 1840].

Helix (Cantareus) aperta Born, 1778.

1. — *Helix aperta* Born, 1778. Alpes-Maritimes : Antilles, Menton, Nice, Ile Sainte-Marguerite. Var : Draguignan, Fréjus, Hyères, Cap Nègre, Rians, Roquebrune, Sanary, Vidauban. Corse]V-9].
2. — *Helix Korægælia* Bourguignat, 1882. Alpes-Maritimes : Cannes, Environs de Nice. Var : Hyères, Saint-Raphaël, Sanary. Corse : Calvi [V-9].

Sous-Genre Tyrrhenaria P. Hesse, 1918.

Helix (Tyrrhenaria) tristis Pfeiffer, 1845.

Helix tristis Pfeiffer 1845. Corse [V-9].